

Prescripción de Opiáceos *conozca los hechos*

¿Cuáles son los riesgos del mal uso de analgésicos de prescripción (opiáceos)?

Hable con su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos de prescripción que tome.

- Confusión mental
- Somnolencia
- Cambios en el cerebro que generan tolerancia, llevando a la dependencia

SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA:

Agitación, dolor en músculos y huesos, insomnio, diarrea, vómitos, escalofríos con piel de gallina, movimientos de patadas, deseo severo que puede llevar a una recaída

EFFECTOS TOTALES EN EL CUERPO:

Euforia, calentamiento corporal, mala nutrición, sobredosis fatal

EMBARAZO Y BEBÉS: Aborto espontáneo, bajo peso al nacer, retrasos en el desarrollo, adicción en bebés

- Enfermedades infecciosas como VIH, Hepatitis B y Hepatitis C si son inyectados
- Presión arterial alta y/o baja
- Respiración lenta e irregular que puede ser fatal
- Constipación
- Calambres
- Náusea
- VIH y otras enfermedades de transmisión sexual por tener sexo inseguro mientras está bajo sus efectos

Síntomas de sobredosis

**PIEL FRÍA Y HÚMEDA BOCA SECA
PULSO DÉBIL SOMNOLENCIA PRESIÓN
ARTERIAL BAJA COMA UÑAS
Y LABIOS AZULES ESPASMOS
MUSCULARES DESORIENTACIÓN
VÓMITO INCONSCIENCIA
CONVULSIONES PUPILAS CONTRAÍDAS
FALTA DE RESPIRACIÓN
O RESPIRACIÓN SUPERFICIAL**

¿Necesita ayuda?

Para derivación y apoyo emocional gratuitos:
Línea de ayuda para la recuperación de Washington
1-866-789-1511
Línea para adolescentes
1-866-833-6546

Hechos rápidos

- Los opiáceos de prescripción son medicamentos que alivian el dolor.
- Pueden ser adictivos si no los usa de acuerdo con las indicaciones del médico.
- Más personas mueren de sobredosis de opiáceos que de cualquier otra droga.



Casi 17,000 personas mueren cada año por sobredosis de analgésicos de prescripción.

Guarde sus medicamentos bajo llave y descártelos de manera segura. Visite: www.TakeBackYourMeds.org

¿Cómo le afecta su consumo?

Vea por usted mismo en www.drugscreening.org